

regimen 詳細

Pertuzumab/trastuzumab/vorhyaluronidase	15mL/body	D1	皮下
フェスゴ皮下IN			
Pertuzumab/trastuzumab/vorhyaluronidase	10mL/body	D1	皮下
フェスゴ皮下MA			
docetaxel	75mg/m2	D1	d.i.v
ドセタキセル			

特記事項

21日を1クールとする。

・フェスゴの前回投与日から6週間未満のときにはMA（維持投与量）、6週間以上のときにはIN（初回投与量）を投与。その後は3週間毎にMA（維持投与量）を投与。

・初回投与時は30分の経過観察を行う。2サイクル目以降は、Infusion reaction等の問題がなく、忍容性が良好であれば、観察時間は15分まで短縮可能。

・初回投与時は8分以上、2回目以降の投与時間は5分以上。

※パージェタ+トラスツズマブ（IV）からフェスゴに切り替える場合：直近の投与日から6週間未満のときにはフェス語のMA（維持投与量）を、6週間以上のときにはフェスゴのIN（初回投与量）を投与。

※フェスゴからパージェタ+トラスツズマブ（IV）に切り替える場合：直近の投与日から6週間未満のときはパージェタ、トラスツズマブともに維持投与量、6週間以上のときはパージェタ、トラスツズマブとも初回投与量を投与。