regimen　ﾌｪｽｺﾞ+ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ療法　　疾患名　HER2陽性乳がん

regimen 詳細

Pertuzumab/trastuzumab/vorhyaluronidase	15mL/body	D1	皮下
ﾌｪｽｺﾞ皮下IN			
Pertuzumab/trastuzumab/vorhyaluronidase	10mL/body	D1	皮下
ﾌｪｽｺﾞ皮下MA			
docetaxel	75mg/㎡	D1	d.i.v
ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ			

特記事項

21日を1クールとする。

・ﾌｪｽｺﾞの前回投与日から6週間未満のときにはMA（維持投与量）、6週間以上のときにはIN（初回投与量）を投与。その後は3週間毎にMA（維持投与量）を投与。

・初回投与時は30分の経過観察を行う。2ｻｲｸﾙ目以降は、Infusion reaction等の問題がなく､忍容性が良好であれば､観察時間は15分まで短縮可能。

・初回投与時は8分以上､2回目以降の投与時間は5分以上。

※ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ(IV)からﾌｪｽｺﾞに切り替える場合：直近の投与日から6週間未満のときにはﾌｪｽｺﾞのMA（維持投与量）を、6週間以上のときにはﾌｪｽｺﾞのIN（初回投与量）を投与。

※ﾌｪｽｺﾞからﾊﾟｰｼﾞｪﾀ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ(IV)に切り替える場合：直近の投与日から6週間未満のときはﾊﾟｰｼﾞｪﾀ､ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞともに維持投与量、6週間以上のときはﾊﾟｰｼﾞｪﾀ､ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞとも初回投与量を投与。